


**ANTIBIOGRAMA ACUMULADO DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA  
DE OCTUBRE 2025 A MARZO 2026**

**UROCULTIVOS**

**Distribución de microorganismos aislados en urocultivos**

Grupo	Microorganismo	Total n (%)
Bacterias	Enterococcus faecalis	13 (20.3%)
	Escherichia coli	12 (18.8%)
	Klebsiella pneumoniae	6 (9.4%)
	Enterococcus faecium	1 (1.6%)
	Klebsiella oxytoca	1 (1.6%)
	Staphylococcus aureus	1 (1.6%)
	Staphylococcus saprophyticus	1 (1.6%)
Hongos	Candida glabrata	18 (28.1%)
	Candida albicans	11 (17.2%)
<b>TOTAL</b>		<b>64 (100%)</b>

**Distribución de bacterias aisladas en urocultivos  
(n = 35)**




Los porcentajes fueron calculados con respecto al total de bacterias aisladas en urocultivos.

### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en urocultivos


Microorganismo	Total	BLEE n (%)	CRO S%	PTZ S%	IMP S%	MEM S%	CIP S%	TMP/SMX S%	NIT S%	AMK S%
<i>Escherichia coli</i>	12	4 (33%)	8 (66%)	NR	12 (100%)	12 (100%)	10 (83%)	5 (42%)	12 (100%)	10 (83%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6	6 (100%)	0 (0%)	NR	1 (17%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1	0 (0%)	1 (100%)	NR	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)

#### Producción de BLEE en Enterobacterias



BLEE: β-lactamasas de espectro extendido.

#### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en urocultivos



NR: No reportado (antibiótico no evaluado en el aislamiento).


BLEE: β-lactamasas de espectro extendido.

### Sensibilidad antimicrobiana de cocos Gram positivos aislados en urocultivos

Microorganismo	Total	VRE n (%)	AMP S%	VAN S%	LZD S%	NIT S%	CIP S%
<i>Enterococcus faecalis</i>	13	0	11 (100%)	11 (100%)	11 (100%)	11 (100%)	11 (100%)
<i>Enterococcus faecium</i>	1	0	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)

Microorganismo	Total	MRSA	OXA S (%)	VAN S%	LZD S%	VAN S%	TMP/SMX S%
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	0 (0%)
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	1	NA	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	0 (0%)

#### Sensibilidad antimicrobiana de *Enterococcus faecalis* (n = 13)



VRE: Enterococou resistente a vancomicina; AMP: ampicilina; VAN: vancomicina; LZD: linezolid; NIT: nitrofurantoína; CIP: ciprofloxacino.

### Sensibilidad antimicrobiana de hongos aislados en urocultivos

Microorganismo	Total	Fluconazol S%	Voriconazol S%	Caspofungina S%	Anfotericina S%
<i>Candida albicans</i>	11	11 (100%)	11 (100%)	11 (100%)	11 (100%)
<i>Candida glabrata</i>	18	10 (56%) SDD	18 (100%)	18 (100%)	18 (100%)


*Candida glabrata* presenta susceptibilidad dependiente de dosis (SDD) a fluconazol según criterios CLSI; por lo tanto, la interpretación clínica debe realizarse con cautela y considerando dosis elevadas, sitio de infección y respuesta clínica.

## HEMOCULTIVOS

### Distribución de microorganismos aislados en hemocultivos

Grupo	Microorganismo	Total n (%)
Bacterias	Escherichia coli	9 (28.1%)
	Klebsiella pneumoniae	6 (18.8%)
	Pseudomonas aeruginosa	6 (18.8%)
	Staphylococcus aureus	4 (12.5%)
	Enterococcus faecalis	3 (9.4%)
	Staphylococcus epidermidis	3 (9.4%)
	<b>TOTAL</b>	

### Distribución de microorganismos aislados en hemocultivos (n = 32)




Los porcentajes fueron calculados con respecto al total de aislamientos recuperados en hemocultivos.


### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en hemocultivos

Microorganismo	Total	BLEE n (%)	CRO S%	FEP S%	PTZ S%	IMP S%	MEM S%	CIP S%	TMP/SMX S%	AMK S%
<i>Escherichia coli</i>	9	5 (55%)	4 (44%)	4 (55%)	NR	9 (100%)	9 (100%)	5 (55%)	5 (55%)	5 (55%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	NR	2 (33%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	6	NA	NA	6 (100%)	NR	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	NA	6 (100%)

#### Producción de BLEE en Enterobacterias




#### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en hemocultivos



**Sensibilidad antimicrobiana de cocos Gram positivos aislados en hemocultivos**

Microorganismo	Total	VRE n (%)	AMP S%	VAN S%	LZD S%
<i>Enterococcus faecalis</i>	3	0	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)

Microorganismo	Total	MRSA	OXA S (%)	VAN S%	LZD S%	TMP/SMX S%
<i>Staphylococcus aureus</i>	4	3 (100%)	0 (0%)	4 (100%)	4 (100%)	0 (0%)
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	3	NA	0 (0%)	3 (100%)	3 (100%)	NR




OXA: oxacilina; VAN: vancomicina; LZD: linezolid; NIT: nitrofurantoína;  
 CIP: ciprofloxacino; TMP/SMX: trimetoprim/sulfametoxazol.

## MUESTRAS RESPIRATORIAS

### Distribución de microorganismos aislados en muestras respiratorias

Grupo	Microorganismo	Total n (%)
Bacterias	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	18 (18.4%)
	<i>Enterococcus faecalis</i>	16 (16.3%)
	<i>Escherichia coli</i>	14 (14.3%)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9 (9.2%)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	8 (8.2%)
	<i>Streptococcus pyogenes</i>	2 (2.0%)
	Hongos	<i>Candida glabrata</i>
<i>Candida albicans</i>		21 (21.4%)
<b>TOTAL</b>		<b>98 (100%)</b>



### Distribución de bacterias aisladas en muestras respiratorias (n = 67)



Los porcentajes fueron calculados con respecto al total de bacterias aisladas en muestras respiratorias.

### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en muestras respiratorias

Microorganismo	Total	BLEE n (%)	CRO S%	FEP S%	PTZ S%	IMP S%	MEM S%	CIP S%	TMP/SMX S%	AMK S%
<i>Escherichia coli</i>	14	12 (86%)	2 (14%)	2 (14%)	NR	14 (100%)	14 (100%)	12 (86%)	12 (86%)	12 (86%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	18	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	NR	18 (100%)	18 (100%)	18 (100%)	18 (100%)	8 (100%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9	NA	NA	9 (100%)	NR	9 (100%)	9 (100%)	9 (100%)	0 (0%)	9 (100%)




### Sensibilidad antimicrobiana de cocos Gram positivos aislados en muestras respiratorias

Aislamiento	Total	VRE n (%)	AMP S%	VAN S%	LZD S%
<i>Enterococcus faecalis</i>	16	0	16 (100%)	16 (100%)	16 (100%)

Aislamiento	Total	MRSA	OXA S (%)	VAN S%	LZD S%	VAN S%	TMP/SMX S%
<i>Staphylococcus aureus</i>	8	7 (87%)	1 (13%)	8 (100%)	8 (100%)	8 (100%)	1 (13%)
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2	NA	NA	NA	NA	NA	VA

**Sensibilidad antimicrobiana de *Staphylococcus aureus* (n = 8)**



OXA: oxacilina; VAN: vancomicina; LZD: linezolid; TMP/SMX: trimetoprim/sulfametoxazol.  
S: sensible.

### Sensibilidad antimicrobiana de hongos aislados en muestras respiratorias

Microorganismo	Total	Fluconazol S%	Voriconazol S%	Caspofungina S%	Anfotericina S%
<i>Candida albicans</i>	21	21 (100%)	21 (100%)	21 (100%)	21 (100%)
<i>Candida glabrata</i>	26	10 (38%) SDD	26 (100%)	26 (100%)	26 (100%)


*Candida glabrata* presenta susceptibilidad dependiente de dosis (SDD) a fluconazol según criterios CLSI; por lo tanto, la interpretación clínica debe realizarse con cautela y considerando dosis elevadas, sitio de infección y respuesta clínica.

## TEJIDOS BLANDOS

### Distribución de microorganismos aislados en muestras de tejidos blandos

Grupo	Microorganismo	Total n (%)
Bacterias Gram positivas	Staphylococcus aureus	17 (22.7%)
	Enterococcus faecalis	11 (14.7%)
	Staphylococcus epidermidis	4 (5.3%)
Bacterias Gram negativas	Escherichia coli	15 (20.0%)
	Klebsiella pneumoniae	6 (8.0%)
	Proteus mirabilis	6 (8.0%)
	Pseudomonas aeruginosa	3 (4.0%)
Hongos	Candida albicans	8 (10.7%)
	Candida glabrata	4 (5.3%)
<b>TOTAL</b>		<b>74 (100%)</b>

### Distribución de bacterias aisladas en muestras de tejidos blandos (n = 59)




Los porcentajes fueron calculados con respecto al total de bacterias aisladas en muestras de tejidos blandos (n = 59).


### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en tejidos blandos

Microorganismo	Total	BLEE n (%)	CRO S%	FEP S%	IMPS%	MEM S%	CIP S%	TMP/SMX S%	AMK S%
<i>Escherichia coli</i>	15	11 (73%)	4 (27%)	4 (27%)	15 (100%)	15 (100%)	8 (53%)	11 (72%)	8 (53%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (33%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)
<i>Proteus mirabilis</i>	6	0 (0%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	NA	NA	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	NA	3 (100%)

### Producción de BLEE en Enterobacterias




### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en tejidos blandos



### Sensibilidad antimicrobiana de cocos Gram positivos aislados en tejidos blandos

Aislamiento	Total	VRE n (%)	AMP S%	VAN S%	LZD S%
<i>Enterococcus faecalis</i>	11	0	11 (100%)	11 (100%)	11 (100%)

Aislamiento	Total	MRSA	OXA S (%)	VAN S%	LZD S%	VAN S%	TMP/SMX S%
<i>Staphylococcus aureus</i>	17	13 (76%)	4 (24%)	17 (100%)	17 (100%)	17 (100%)	4 (27%)
<i>Streptococcus epidermidis</i>	4	NA	0 (0%)	4 (100%)	4 (100%)	4 (100%)	0 (0%)



OXA: oxacilina; VAN: vancomicina; LZD: linezolid; TMP/SMX: trimetoprim/sulfametoxazol.  
S: sensible.

### Sensibilidad antimicrobiana de hongos aislados en tejidos blandos

Microorganismo	Total	Fluconazol S%	Voriconazol S%	Caspofungina S%	Anfotericina S%
<i>Candida albicans</i>	8	8 (100%)	8 (100%)	8 (100%)	8 (100%)
<i>Candida glabrata</i>	4	1 (25%) SDD	4 (100%)	4 (100%)	4 (100%)


*Candida glabrata* presenta susceptibilidad dependiente de dosis (SDD) a fluconazol según criterios CLSI; por lo tanto, la interpretación clínica debe realizarse con cautela y considerando dosis elevadas, sitio de infección y respuesta clínica.

## TEJIDOS ÓSEOS

### Distribución de microorganismos aislados en muestras de tejidos óseos

Grupo	Microorganismo	Total n (%)
Bacterias Gram positivas	Staphylococcus aureus	10 (40.0%)
	Enterococcus faecalis	2 (8.0%)
	Streptococcus epidermidis	1 (4.0%)
Bacterias Gram negativas	Escherichia coli	8 (32.0%)
	Pseudomonas aeruginosa	2 (8.0%)
	Klebsiella pneumoniae	1 (4.0%)
	Proteus mirabilis	1 (4.0%)
TOTAL		25 (100%)



### Distribución de bacterias aisladas en muestras de tejidos óseos (n = 25)



Los porcentajes fueron calculados con respecto al total de bacterias aisladas en muestras de tejidos óseos (n = 25).

### Sensibilidad antimicrobiana de bacilos Gram negativos aislados en tejidos óseos

Microorganismo	Total	BLEE n (%)	CRO S%	FEP S%	IMP S%	MEM S%	CIP S%	TMP/SMX S%	AMK S%
<i>Escherichia coli</i>	8	7 (88%)	1 (13%)	1 (13%)	8 (100%)	8 (100%)	5 (63%)	7 (88%)	5 (63%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
<i>Proteus mirabilis</i>	1	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	0 (0%)	NR
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	NA	NA	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	NA	NA




### Sensibilidad antimicrobiana de cocos Gram positivos aislados en tejidos óseos

Aislamiento	Total	VRE n (%)	AMP S%	VAN S%	LZD S%
<i>Enterococcus faecalis</i>	2	0 (0%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)

Aislamiento	Total	MRSA	OXA S (%)	VAN S%	LZD S%	VAN S%	TMP/SMX S%
<i>Staphylococcus aureus</i>	10	7 (70%)	3 (30%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	3 (30%)
<i>Streptococcus epidermidis</i>	1	NA	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	0 (0%)

Sensibilidad antimicrobiana de *Staphylococcus aureus* (n = 10)



OXA: oxacilina; VAN: vancomicina; LZD: linezolid; TMP/SMX: trimetoprim/sulfametoxazol.  
S: sensible.